



Tel.: 07/769014

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني

دورة عام ٢٠٢٠

اختصاص العناية التمريضية

المعدل: (٢٠)
المدة: ٤٥ دقيقة

الاختصاص والرمز : عناية ترميزية (٢٧٧٠٢)
المادة : العناية بالطفل وحديثي الولادة
المستندات المسموح بها: لا شيء

ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة: (علامة واحدة لكل إجابة صحيحة)

١- الريقان الفيزيولوجي للمولود الجديد يكون:

- أ- أول ٢٤ ساعة
- ب- أول ٤٢ ساعة
- ج- أول ٧٢ ساعة
- د- أول ٢٧ ساعة

٢- عند اجراء مقارنة ما بين جدول أبغار و جدول سيلفرمان:

- أ- جدول أبغار مرتفع = حالة جديدة
- ب- جدول سيلفرمان مرتفع = حالة جيدة
- ج- جدول سيلفرمان منخفض = حالة خطيرة
- د- جدول أبغار منخفض = حالة جيدة

٣- يتميّز جدول سيلفرمان، بخمس مؤشرات هي:

- أ- إزرقاق الأطراف والشخير
- ب- تراجع الخنجري مع شخير
- ج- يصبح البطن مسطح مع شخير
- د- جلد زهري اللون مع شخير

٤- سيدة فنة دمها AB^+ و الزوج O^+ ، انجبت طفلاً ذكراً. العلامات الأساسية والكبرى لعدم التطابق بين فئتي الدم عند المولود الجديد يستدل عليها عبر ما يلي:

- أ- Coombs Test = سلبي
- ب- ريقان أول ٢٤ ساعة بعد الولادة
- ج- ريقان بعد أول ٢٤ ساعة بعد الولادة
- د- ريقان بعد ٧٢ ساعة من الولادة

٥- البزل القطني وسيلة تشخيصية لطفل يعاني من التهاب السحايا البكتيري، سوف يكون سائل النخاع الشوكي:

- أ- عكراً ، نسبة البروتين مرتفعة، نسبة السكر منخفضة
- ب- عكراً ، نسبة البروتين مرتفعة، نسبة السكر مرتفعة
- ج- عكراً أو عادياً ، نسبة البروتين مرتفعة، وضغط مرتفع
- د- يكون شفافاً ، نسبة البروتين مرتفعة، نسبة السكر منخفضة

٦- أي من العلامات السريرية تشير الى التهاب السحايا البكتيري؟

- أ- استقراغ نافوري مع اسهال
- ب- علامة كيرنغ سلبية وفرفة جلدية
- ج- خوف من الضوء، صداع قوي واسهال
- د- استقراغ نافوري مع خوف من الضوء

٧- NNST، يدل على:

- أ- فحص فنة الدم
- ب- التشخيص المبكر للمعانة التنفسية للمولود الجديد
- ج- فحص مستوى السكر على الريق
- د- الاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية الكروموزومية Chromosomal Scongenital

٨- طفل ولد في الأسبوع ٣٤ من الحمل بوزن ١٨٠٠ غرام، ظهرت عليه عوارض jitteriness مع تصلب العضلات. هذه jitteriness قد تكون ناتجة عن:

- أ- صدمات الولادة
- ب- انخفاض الكالسيوم
- ج- انخفاض السكر
- د- اختلاجات

٩- ما هي المؤشرات التقييمية التي قد تلاحظها الممرضة عند طفل خديج يعاني من معاناة تنفسية Intercostal retraction:

- أ- انخفاض الضغط وتباطؤ دقات القلب
- ب- تسارع دقات القلب وتراجع في عضلات القفص الصدري
- ج- إزرقاق الأطراف وشخير
- د- لون شاحب مع شخير

١٠- الإستسقاء الدماغي عند المولود الجديد، ناتج عن:

- أ- صدمة بسبب ولادة مع استخدام الملاقط
- ب- شرب الكحول خلال الحمل
- ج- أم تعاني من داء السكري
- د- إصابة الأم بجرثومة Toxoplasmosis

١١- ما ذا نراقب لتقييم إذا كانت سماكة الحليب مناسبة عند طفل يعاني من الإرتداد المعوي GER :

- أ- التبول المكرر
- ب- الإستفراغ
- ج- زيادة الوزن
- د- التبرز

١٢- الطفل جواد يعاني من نوبات التهاب الجهاز التنفسي العلوي. ما هي العلامات التي يجب تقييمها؟

- أ- التعب
- ب- خسارة الوزن
- ج- إحتقان أنفي
- د- اسهال مائي

١٣- الطفل الخديج مع متلازمة المعاناة التنفسية، يتلقى علاج Surfactant ، كيف يمكن للممرضة أن تشرح للأهل حول العلاج بال Surfactant؟

- أ- ال Surfactant يسمح لرئة طفلكم أن تقوم بعملية التبادل الغازي
- ب- ال Surfactant يمنع الطفل من طلب الكثير من المسكنات
- ج- ال Surfactant يستخدم لتقليل نوبات إنقطاع التنفس الدوري
- د- يستعمل ال Surfactant كإجراء وقائي لعلاج التهاب الجهاز التنفسي

١٤- الجدول الذي يقيم متلازمة المعاناة التنفسية للمولود الجديد:

- أ- جدول ابغار
- ب- جدول سيلفرمان
- ج- جدول سيلفرمان وأبغار معاً
- د- لا شيء مما ورد أعلاه

١٥- الإسهال المزمن عند طفل عمره أربعة أشهر هو:

- أ- إسهال حاد لأكثر من ثلاثة أشهر
- ب- هو إسهال حاد لم يعالج جيداً
- ج- هو تسمم غذائي مستمر
- د- هو تحسن غذائي مستمر

١٦- يتميز جدول سيلفرمان:

- أ- يقيم حالة المولود الجديد من الدقيقة الأولى للدقيقة الخامسة بعد الولادة
- ب- يقيم حالة المولود الجديد من الساعة الأولى للساعة الخامسة بعد الولادة
- ج- يقيم الحالة التنفسية للمولود الجديد من الدقيقة الأولى لغاية ٦ أشهر
- د- يقيم الحالة التنفسية للمولود الجديد من الدقيقة الأولى لغاية ٦ دقائق

١٧- أدخلت الطفلة نور وعمرها خمسة أشهر الى قسم الطوارئ، مع احتمال وجود إستقساء في الرأس، ما هي العلامات السريرية الأولية:

- أ- انتفاخ اليافوخ الأمامي
- ب- خمول
- ج- كبير قطر الرأس بالنسبة للعمر
- د- كل ما ورد أعلاه

١٨- طفل عنده إصابة في الرأس تعرض لنوبة إختلاج. ما هو دور الممرضة خلال نوبة الإختلاج؟

- أ- مراقبة بدء وفترة النوبة مع تأمين مجاري هوائية مفتوحة
- ب- الإمساك بالطفل
- ج- جمع معلومات طبية
- د- لا شيء مما ورد أعلاه

١٩- ما هو الدواء الذي يعطى للطفل الذي يعاني من نوبات اختلاجية:

- أ- (Luminal) Phenobarbital
- ب- (Epanutin) Phenytoin
- ج- (Depakene) Valporic Acid
- د- كل ما ورد أعلاه

٢٠- التحسس الغذائي على سكريات الحليب، يعني حساسية تجاه:

- أ- مكونات حليب الأطفال فقط
- ب- مكونات حليب الأم وحليب الأطفال معاً
- ج- جميع مشتقات الحليب
- د- فقط الحليب تحت عمر الثلاث سنوات

المعدل: (٢٠)
المدة: ٤٥ دقيقة

الإختصاص والرمز: العناية التمريضية (٢٧٧٠٣)
المادة : العناية الصحية
المستندات المسموح بها: لا شيء

ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة: (علامة واحدة لكل إجابة صحيحة)

- ١- أي مما يلي يمكن أن يسبب نقص السكر في الدم لدى مريض السكري من النوع الأول:
 - أ- تمرين بدني بعد وجبة منتصف النهار
 - ب- عدم وجود وجبة عند الظهر أو تأجيل الوجبة
 - ج- نسيان علاج السكري
 - د- حقنة ١٠ وحدات من الأنسولين البطيء بدلاً من الأنسولين السريع
- ٢- العلامات السريرية التي يمكن أن تظهر في فرط نشاط الغدة الدرقية هي:
 - أ- بطم دقات القلب ، برودة الجلد ، السمنة
 - ب- جحوظ ، خفقان ، تسرع دقات القلب
 - ج- فقدان الوزن ، العصبية ، الرعشة
 - د- الاجابتان (ب) + (ج) صحيحتان
- ٣- يتميز الحمض الكيتوني السكري بما يلي:
 - أ- الحمض الكيتوني فقط
 - ب- Hypoglycemia, hyperacetonuria and metabolic acidosis
 - ج- Hyperglycemia, hypoketonuria and metabolic acidosis
 - د- Hyperglycemia, hyperacetonuria and metabolic acidosis
- ٤- قرحة المعدة (كل الإجابات صحيحة ماعدا واحدة):
 - أ- قد يكون بسبب Helicobacter pylori
 - ب- تسبب Epigastric pain
 - ج- الفحص الأول الذي يجب إجراؤه هو فحص Gastro-duodenal fibroscopy
 - د- العلاج طبي فقط
- ٥- يشمل الفحص البيولوجي للكبد ما يلي:
 - أ- Aminotransferases (SGOT + SGPT)
 - ب- Alkaline phosphatases (PAL) and Gamma-glutamyl transpeptidase (GGT)
 - ج- Bilirubin
 - د- كل الإجابات صحيحة
- ٦- ما هي العلامة التي لا تظهر في سرطان البنكرياس؟
 - أ- اليرقان
 - ب- البول داكن اللون والبراز باهتاً
 - ج- Dysphagia
 - د- فقدان الوزن
- ٧- علامات فقر الدم (جميع الإجابات صحيحة باستثناء واحدة):
 - أ- عسر وضيق في التنفس
 - ب- إزرقاق
 - ج- صداع الرأس
 - د- دوار (دوخة)
- ٨- خلايا الدم البيضاء هي:
 - أ- تشارك في الدفاع عن الجسم
 - ب- تشارك في الاستجابة المناعية لرفض زرع الأعضاء أو قبولها
 - ج- كل الإجابات صحيحة
 - د- كل الإجابات خاطئة
- ٩- مراقبة مريض سرطان الدم (leukemia) الذي يخضع لعلاج كيميائي (كل الإجابات صحيحة باستثناء واحدة):
 - أ- حدوث غثيان وقيء
 - ب- حدوث تنميل
 - ج- حدوث التهاب الغشاء المخاطي (mucositis)
 - د- ظهور الحمى
- ١٠- تتضمن عوامل الخطر للسكتة الدماغية (ischemic stroke) ما يلي:
 - أ- فرط كوليسترول الدم
 - ب- العلاج بالإستروجين والبروجسترون
 - ج- مرض السكري وارتفاع ضغط الدم
 - د- كل الإجابات صحيحة

١١- يعرف مرض باركنسون بأنه متلازمة نقص في:

- أ- السيروتونين
- ب- الأدرينالين
- ج- الدوبامين
- د- أستيل كولين

١٢- مجموع نقاط غلاسكو يختلف بين:

- أ- ١٥ - ٠
- ب- ١٥ - ١
- ج- ١٥ - ٣
- د- ١٦ - ٣

١٣- أي من الخصائص التالية تنطبق على الورم الخبيث؟

- أ- حدود واضحة.
- ب- عدم وجود vascular invasion
- ج- الإنتشار عن طريق غزو العقدة الليمفاوية Diffusion by lymph node invasion
- د- عدم وجود Metastasis

١٤- عند التعامل مع الأدوية المضادة للسرطان، يجب استخدام ما يلي باستثناء واحدة (جميع الإجابات صحيحة باستثناء واحدة):

- أ- قبة وقناع
- ب- بلوزة بأكمام قصيرة
- ج- بلوزة بأكمام طويلة
- د- نظارات واقية

١٥- كل ما يلي هو من بين الآثار الجانبية للعلاج بالكورتيكوستيرويد باستثناء واحد:

- أ- ارتفاع السكر في الدم ونقص بوتاسيوم الدم وهشاشة العظام
- ب- انخفاض الاستجابة المناعية
- ج- احتباس الماء والصوديوم مع وذمة الأطراف السفلية وارتفاع ضغط الدم
- د- نقص السكر في الدم ونقص الصفائح

١٦- الأسباب الثلاثة الرئيسية لاضطرابات الأمراض الرئوية المتعددة هي (كل الإجابات صحيحة ما عدا واحدة):

- أ- التهاب الشعب الهوائية المزمن
- ب- انتفاخ الرئة
- ج- الانصمام الرئوي (pulmonary embolism)
- د- الربو

١٧- أي من الفحوصات التي لن تستخدم لتشخيص متلازمة تحلل الورم (tumor lysis syndrome)؟

- أ- تعداد الدم الكامل (CBC)
- ب- أشعة الصدر
- ج- مخطط كهربية القلب ECG
- د- الألكتروليتات electrolytes

١٨- أي من الأطعمة التالية يجب على المريض المصاب بسرطان الدم تجنبها؟

- أ- الخبز الأبيض
- ب- خضار نية
- ج- تفاح مطهي (مسلوق)
- د- اللحوم المطبوخة

١٩- أي مما يلي لا يعد سببًا شائعًا لفقر الدم؟

- أ- نقص الحديد الغذائي
- ب- نقص فيتامين ج
- ج- نزيف الجهاز الهضمي
- د- الاضطرابات الوراثية لخلايا الدم الحمراء

٢٠- مريض يعالج من أزمة الغدة الكظرية (أزمة أديسون). ما هي المعدلات المخبرية الأكثر أهمية للمراقبة؟

- أ- مصل بيكربونات الصوديوم Serum bicarbonate & sodium
- ب- مصل الجلوكوز والكيونات Serum glucose & ketones
- ج- مصل الصوديوم والبوتاسيوم Serum sodium & potassium
- د- مصل الكالسيوم والمغنيسيوم Serum calcium & magnesium

Circle the correct answer: (1pt/correct answer)

- 1- An 82-year-old male admitted to the hospital with dehydration and pneumonia. After receiving the patient from emergency department, the nurse notices that his IV infusion has infiltrated. Which of the following is the best initial response by the nurse?
 - a- Stop the infusion, remove the IV catheter, and restart the infusion in another site
 - b- Remove the IV catheter and apply a cool compress to the site
 - c- Apply moist heat to the site
 - d- Gently massage the site
- 2- The care plan for a 42-year-old man with deep vein thrombosis (DVT) includes monitoring the patient for complications. Which of the following pulmonary complications is the patient most at risk of developing?
 - a- Pulmonary embolism
 - b- Pneumothorax
 - c- Pulmonary edema
 - d- Pneumonia
- 3- Three days after an abdominal aortic aneurysm repair for a 79-year-old patient, he develops pulmonary Embolus. Which nursing diagnosis takes priority?
 - a- Ineffective tissue perfusion (cardiopulmonary)
 - b- Impaired physical mobility
 - c- Ineffective airway clearance
 - d- Risk for aspiration
- 4- To maintain airway patency during a newly diagnosed stroke, which of the following nursing interventions is appropriate?
 - a- Thicken all liquid
 - b- Restrict dietary and parenteral fluids
 - c- Place the patient in the supine position
 - d- Have a tracheal suction available at all times
- 5- Which of the following conditions is a risk factor for hemorrhagic stroke?
 - a- Coronary artery disease
 - b- Diabetes
 - c- Hypertension
 - d- Recent viral infection
- 6- Which of the following techniques is incorrect when giving a bath to a patient?
 - a- Close the bed curtain to provide privacy
 - b- Change the bath water when it becomes tepid
 - c- Wash the female perineum from pubis toward the anus
 - d- Wash the patient without gloves to improve the nurse-patient relationship
- 7- Which of the following characteristics of an abdominal incision would indicate a potential for delayed wound healing?
 - a- Sutures dry and intact
 - b- Wound edges in close approximation
 - c- Purulent drainage on soiled wound dressing
 - d- Sanguineous drainage in wound collection drainage bag
- 8- For a patient with a stroke, which of the following criteria must be filled before the patient is fed?
 - a- The gag reflex returns
 - b- Speech returns to normal
 - c- Cranial nerves III, IV, and VI are intact
 - d- The patient swallows small sips of water without coughing
- 9- A pulse oximeter gives what type of information about the patient?
 - a- Amount of carbon dioxide in the blood
 - b- Amount of oxygen in the blood
 - c- Percentage of hemoglobin carrying oxygen
 - d- Respiratory rate
- 10- Which of the following conditions or factors may cause an acquired immune deficiency?
 - a- Age
 - b- Genetics
 - c- Environment
 - d- Medical treatments

- 11- Hepatitis B immunization shouldn't be given to which of the following groups?**
- a- Immunosuppressed patients
 - b- Immigrants
 - c- Health care professionals
 - d- Individuals older than age 65years
- 12- Dislocation of the hip includes which of the following symptoms?**
- a- Pain relieved with pressure
 - b- Pain in the inguinal area, abnormal gait
 - c- Internal rotation of the knee, abduction of the leg
 - d- Pain in the hip, the thigh appears longer than the unaffected leg
- 13- A patient who is receiving acetaminophen for osteoarthritis complains of continuing pain. The physician prescribes refecoxib (Vioxx). Which medication instruction should the nurse provide?**
- a- "Don't take the medication with dairy products."
 - b- "Report stomach upset to the physician."
 - c- "If you miss a dose, take a double dose the next day."
 - d- "Use a stool softener or fiber laxative daily to prevent constipation."
- 14- After hip replacement, which of the following activity is usually ordered?**
- a- Bed rest
 - b- No restrictions
 - c- No weight bearing
 - d- Limited weight bearing
- 15- Which of the following nursing interventions is appropriate for a patient in traction?**
- a- Assess the pin sites every shift and as needed
 - b- Add and remove weights as the patient wants
 - c- Make sure the knots in the rope catch on the pulley
 - d- Give range of motion to all joints, including those immediately proximal and distal to the fracture, every shift
- 16- A patient with Addison's disease is receiving a maintenance dose of steroids. Which topic should the nurse include in discharge teaching?**
- a- Importance of restricting fluids
 - b- Watching for signs of hypoglycemia
 - c- Taking steroids exactly as prescribed
 - d- Adjusting steroids doses based on dietary intake and exercise
- 17- Tumors of the adrenal medulla usually produce which of the following symptoms?**
- a- Carpopedal spasm
 - b- Hyperglycemia
 - c- Hypertension
 - d- Exophthalmic
- 18- The nurse is caring for a patient with chronic renal failure. The laboratory results indicate hypocalcemia and hyperphosphatemia. When assessing the patient the nurse should be alert for which of the following?**
- a- Trousseau's sign
 - b- Cardiac arrhythmias
 - c- Fractures
 - d- All answers are correct
- 19- Nursing care for a diabetic with peripheral neuropathy includes:**
- a- Assessing pain to rule out peripheral vascular insufficiency
 - b- Inspecting the feet for breaks in skin integrity
 - c- Palpating the lower extremities for temperature variations
 - d- All answers are correct
- 20- The nurse knows that an intermediate-acting insulin should reach its "peak" in:**
- a- 1 to 2 hours
 - b- 4 to 6 hours
 - c- 8 to 16 hours
 - d- 18 to 20 hours

ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة: (علامة و ربع العلامة لكل اجابة صحيحة)

١. تشمل أعراض الذهان:
 - أ- الهذيان
 - ب- الخوف والقلق
 - ج- توهان زماني مكاني (Temporal-spatial disorientation)
 - د- مدرك لإحتياجاته
٢. من بين سمات الشخصية التالية ، سمة واحدة تنتمي إلى الشخصية الوسواسية. ما هي؟
 - أ- التناقض الوجداني Ambivalence
 - ب- رغبة في الكمال Perfectionism
 - ج- هوس الكذب Mythomania
 - د- الاندفاع Impulsivity
٣. رهاب الخلاء هو:
 - أ- الخوف من الأماكن العامة
 - ب- الخوف من الحيوانات
 - ج- الخوف من المرض
 - د- الخوف من الاماكن المغلقة
٤. بين العبارات التالية، حدد تلك التي تميز انفصام الشخصية Schizophrenia:
 - أ- السلوك المعادي للمجتمع
 - ب- The Dissociative disorder
 - ج- وجود رهاب (فوبيا)
 - د- وجود عصاب
٥. الفصام هو:
 - أ- ذهان مزمن خطير
 - ب- يمكن أن يظهر على شكل هذيان متماسك
 - ج- قد يتطور إلى عصاب شديد
 - د- قد يستقر بعلاج الليثيوم
٦. يتميز هذيان المصاب بالبارانويا بما يلي:
 - أ- لديه تطور مزمن
 - ب- Has a dominant interpretive mechanism
 - ج- منطقي ومتجانس
 - د- كل الإجابات صحيحة
٧. نلاحظ الهلوسة:
 - أ- في الاكتئاب
 - ب- في الرهاب
 - ج- في الوسواس
 - د- في الفصام الزوري (البارانوي) paranoid schizophrenia
٨. يسمى التخصص الطبي لدراسة وعلاج الأمراض المتعلقة بالشيوخوخة:
 - أ- Gerontology
 - ب- Geriatric
 - ج- Cardiology
 - د- لا شيء مما ذكر أعلاه
٩. العامل (أو العوامل) المسببة لسقوط المسن من المقترحات التالية هو:
 - أ- عمر < ٨٠ سنة
 - ب- إستعمال أدوية عديدة Polypharmacy
 - ج- داء باركينسون
 - د- جميع الإجابات صحيحة

١٠. ضعف البصر الذي يتكون من انخفاض تدريجي في قوة التكيف (accommodation) (تجد العين صعوبة في تمييز الأشياء القريبة) هو:

- أ- Presbyopia
- ب- Presbycusis
- ج- Hypermetropia
- د- لاشيء مما ذكر أعلاه

١١. في شيخوخة العضلات نلاحظ:

- أ- ضمور العضلات
- ب- انخفاض قوة العضلات
- ج- فقدان مرونة ألياف العضلات
- د- كل الإجابات صحيحة

١٢. من المضاعفات الرئيسية للجفاف عند كبار السن:

- أ- Hypovolemic choc
- ب- Ketoacidosis coma
- ج- Neurogenic choc
- د- الإجابتان (أ) و (ب) صحيحتان

١٣. أهم العلامات السريرية للجفاف لدى المسنين:

- أ- بطء دقات القلب، agitation، polyuria، polydipsia
- ب- Asthenia, psychomotor retardation, anorexia and weight loss
- ج- Tachycardia, sweating, restlessness and polyuria
- د- لا شيء مما ذكر أعلاه

١٤. في شيخوخة المسالك البولية نلاحظ:

- أ- زيادة وزن الكلى
- ب- انخفاض سعة المثانة
- ج- انخفاض في عدد nephrons
- د- الإجابتان (ب) و (ج) صحيحتان

١٥. أي من الأسباب التالية قد تساهم في ظهور أو تفاقم سلس البول؟

- أ- Fecal impaction - Bedsore of the Sacrum
- ب- التهاب المسالك البولية - Complete bed rest (CBR)
- ج- بعض الأدوية
- د- جميع الإجابات صحيحة

١٦. في حالة العصاب يكون المريض على علم بمرضه:

- أ- صح
- ب- خطأ

المعدل: (٢٠)
المدة: ٤٥ دقيقة

الإختصاص والرمز : العناية التمريضية (٢٧٧٠٤)
المادة : العناية الجراحية
المستندات المسموح بها: لا شيء

ضع دائرة حول الاجابة الصحيحة: (علامة واحدة لكل اجابة صحيحة)

- ١- ادخل مريض الى المستشفى مصاب بنزيف تحت العنكبوتية يشكو من صداع شديد وتصلب في الرقبة وفيء مقذوف. تعرف الممرضة أن البزل القطني (LP) يبطل (غير مسموح) عند هذا المريض في أي من الظروف التالية؟
 - أ- استمرار القيء
 - ب- زيادة الضغط داخل الجمجمة (ICP)
 - ج- يحتاج المريض إلى تهوية ميكانيكية
 - د- توقع وجود دم في السائل الدماغي الشوكي (CSF)
- ٢- إفراغ كميات صغيرة متكررة من البول بعد استئصال الصفيحة الفقرية القطنية قد يشير إلى:
 - أ- مرض السكري الكاذب Diabetes insipidus
 - ب- الحماض الكيتوني السكري Diabetic ketoacidosis
 - ج- احتباس البول
 - د- التهاب المسالك البولية
- ٣- يعاني المريض المصاب بصدمة في الرأس من إخراج بول ٣٠٠ مل/ ساعة وتجفاف الجلد والأغشية المخاطية. أي من التدخلات التمريضية التالية هو الأنسب للقيام بها على الفور؟
 - أ- تقييم urine specific gravity
 - ب- توقع علاج الفشل الكلوي
 - ج- توفير كريمات ترطيب للبشرة لمنع تشققها
 - د- إعطاء السوائل الوريدية وإخبار الطبيب بذلك
- ٤- أي من تعليمات الخروج التالية يجب أن تعطى للمريض بعد استئصال غدة البروستات؟
 - أ- تجنب الاجهاد خلال التبرز
 - ب- الإبلاغ عن وجود دم متخثر (clots) في البول على الفور
 - ج- الجلوس في حوض ماء دافئ يوميا للراحة
 - د- العودة إلى الأنشطة المعتادة في غضون ٣ أسابيع
- ٥- أي من المضاعفات التالية لاستئصال المعدة يجب أن تعلم الممرضة المريض مراقبتها؟
 - أ- الإمساك
 - ب- Dumping syndrome
 - ج- تشنج المعدة
 - د- تقلصات معوية
- ٦- أي من الاختبارات التشخيصية التالية يمكن إجراؤها لتحديد ما إذا كان المريض مصابا بسرطان المعدة؟
 - أ- حقنة الباريوم الشرجية
 - ب- تنظير القولون
 - ج- تنظير المعدة
 - د- Bun, cr, electrolyte
- ٧- من بين المضاعفات التالية، لا يمكن ربط أحدها بشكل منهجي بالعلاج الجراحي للورم الحميد البروستاتي:
 - أ- النزف
 - ب- العجز الجنسي
 - ج- سلس البول
 - د- الانسداد الرئوي
- ٨- التسمم بالمورفين يؤدي إلى:
 - أ- توسع حدقة العين
 - ب- سعال مزعج
 - ج- Polypnea
 - د- التنفس العميق والبطيء
- ٩- أي من العلامات السريرية التالية تعتبر من علامات الكسر؟
 - أ- الوخز والبرودة وفقدان النبض
 - ب- فقدان الإحساس والاحمرار والبرودة
 - ج- البرودة والاحمرار وموقع جديد للألم
 - د- احمرار ، ألم في مكان الإصابة
- ١٠- رفع الطرف الموجود عليه جبيرة يمنع التورم. أي من الإجراءات التالية يصف بشكل أفضل كيفية القيام بذلك؟
 - أ- وضع الطرف مع الجبيرة بالقرب من الجسم
 - ب- وضع الطرف مع الجبيرة على مستوى القلب
 - ج- وضع الطرف مع الجبيرة تحت مستوى القلب
 - د- وضع الطرف مع الجبيرة فوق مستوى القلب

- ١١- بعد استئصال الفص الأيمن السفلي لسرطان الرئة ، تعود المريضة إلى غرفتها مع وجود أنبوب صدر في مكانه. تقوم الممرضة بصياغة خطة رعاية مع تشخيص تمريضي أولي "ضعف تبادل الغازات المتعلقة بجراحة الرئة". ما هي النتيجة المتوقعة المناسبة لهذا التشخيص؟
- أ- يجلس المريض منتصباً ويميل قليلاً إلى الأمام
 - ب- سيطلب المريض مسكنات الألم حسب الحاجة
 - ج- سيحافظ المريض على مستوى قياس التأكسج النبضي أعلى من ٩٣٪
 - د- أن يكون المريض خالي من الألم
- ١٢- الانصمام الدهني (Fat embolism) هي إحدى المضاعفات المتعلقة بما يلي:
- أ- كسر في الحوض
 - ب- كسر في العظام الطويلة
 - ج- كسر في عظم العضد
 - د- كل الإجابات خاطئة
- ١٣- لتشخيص المسببات المرضية لنزيف الجهاز الهضمي العلوي، الفحص الأكثر دقة:
- أ- Esogastroduodenal Transit
 - ب- The abdominal scan
 - ج- التنظير Endoscopy
 - د- تصوير الشرايين Arteriography
- ١٤- دواعي يتر الطرف السفلي هي:
- أ- الغرغرينا السكرية
 - ب- المرحلة الرابعة من اعتلال الشرايين في الأطراف السفلية
 - ج- أنواع معينة من سرطان العظام (السااركوما العظمية)
 - د- كل الإجابات صحيحة
- ١٥- من بين العبارات التالية بخصوص (hepatic colic attack) يوجد جواب خطأ أي من الإجابات التالية؟
- أ- علامة مورفي إيجابية
 - ب- يقع الألم في hypocondrium الأيمن
 - ج- تهدأ بتناول الطعام
 - د- يمكن أن يسبب تثبيط الجهاز التنفسي
- ١٦- في جراحة القنوات الصفراوية يتم وضع مصرف Kehr في:
- أ- المرارة
 - ب- القناة الصفراوية المشتركة common bile duct
 - ج- القناة الكيسية cystic canal
 - د- قناة ويرسونغ
- ١٧- بالنسبة لفحص الاكتشاف المبكر لسرطان غدة البروستات، فإن المكون الأكثر فعالية هو:
- أ- تصوير غدة البروستات بالموجات فوق الصوتية
 - ب- Digital rectal examination
 - ج- خزعة البروستاتا
 - د- The abdomino-pelvic scanner
- ١٨- إن الخطر الناتج عن التوقف المفاجئ عن العلاج بالكورتيكوستيرويد هو:
- أ- فشل كلوي حاد
 - ب- قصور حاد في الغدة الكظرية
 - ج- فشل القلب الاحتقاني
 - د- فشل الجهاز التنفسي الحاد
- ١٩- يمكن أن يترافق المغص الكلوي (renal colic) مع واحدة أو أكثر من العلامات التالية، أيهم؟
- أ- بيلة دموية Hematuria
 - ب- آلام أسفل الظهر الشديدة
 - ج- لا يوجد وضعية مسكنة للألم
 - د- كل الإجابات صحيحة
- ٢٠- إذا حدث الانصباب الجنبى قليل الكمية، فأي من الإجراءات التالية يصف بشكل أفضل كيفية إزالة السائل من الحيز الجنبى واستعادة حالة الرئة المناسبة؟
- أ- إدخال أنبوب صدري (chest tube)
 - ب- إجراء thoracentesis
 - ج- إجراء paracentesis
 - د- السماح للانصباب الجنبى بالتجفيف من تلقاء نفسه